

ПЕРЕХРЕСТЯ УСПІШНИХ РІШЕНЬ



Комплексний контроль
однорічних злакових
і дводольних бур'янів



Перший гербіцид
із крос-спектром
на ячмені та пшениці









Можливість
застосування як навесні,
так і восени

 **Акція® Крос**

syngenta.

Аксіал® Крос

Паспорт препарату

 ПОВНА НАЗВА	Аксіал® Крос 050 ЕС, к. е.
 ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	Піноксаден, 45 г/л + флорасулам, 5 г/л
 ХІМІЧНА ГРУПА	Фенілпіразоліни + триазолпіримідини
 ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
 КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
 УПАКОВКА	5 л

Головні переваги препарату

1

Перший на ринку України гербіцид з крос-спектром на ячмені яром та озимому

2

Комплексний контроль головних однорічних злакових та дводольних бур'янів у посівах пшениці та ячменю

3

Можливість застосування як навесні, так і восени

4

Широке вікно застосування від початку куцнення до прапорцевого листка культури

5

Досконала формуляція не потребує додавання сурфактантів

6

Не має післядії у сівозміні

Застосування препарату



0,7 л/га

осіннє застосування

Бур'яни на початкових стадіях розвитку, переважно злакові та деякі головні дводольні



0,9 л/га

весняне застосування


Перерослі бур'яни, переважно дводольні та головні злакові

СТАДІЯ РОЗВИТКУ БУР'ЯНІВ	2–4 листки — кущення — однорічні злакові бур'яни; 2–6 листків — однорічні дводольні
СЕЛЕКТИВНІСТЬ ДО КУЛЬТУР	Пшениця озима, ячмінь озимий і ярий
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	Ефективний вже при +5 °С. Оптимальна температура — +8–25 °С
ОПАДИ	Через 30 хв після внесення не змивається дощем
ПОДВІЙНА НОРМА	Нефітотоксичний до культури навіть у разі застосування подвійної норми внесення
СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ЗЗР	Може змішуватись з фунгіцидами (стробілурини, азоли, SDHI) та регуляторами росту (Моддус®), а також інсектицидами
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ	100–200 л/га
СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ГЕРБІЦИДАМИ	Для розширення спектра ефективності може змішуватися з: флурокспіпіром, іоксинілом, бромоксинілом, флорасуламом. Також з сульфонілсечовинами: трибенурон-метилом, триасульфуроном та метсульфуроном. У разі змішування з гербіцидами, які містять 2,4-Д, дикамбу чи МЦПА, проявляється часткова втрата ефективності проти злакових бур'янів.

Досконала формуляція

НЕ ПОТРЕБУЄ ДОДАВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПАР (поверхнево активних речовин)

До складу формуляції включено новітню ПАР Адігор — метиловий ефір ріпакової олії, який сприяє кращому розтіканню та проникненню препарату



Час застосування та норма внесення

Озимі культури:

ОСІНЬ:

1–3 листки культури (ВВСН 11–13)

0,7 л/га — 2–4 листки у бур'янів

Метлюг, лисохвіст, пажитниця, підмаренник, падалиця ріпаку (зокрема ІМІ), падалиця соняшнику (ІМІ та SU) та інші хрестоцвітні

ВЕСНА:

До прапорцевого листка культури (ВВСН 39)


0,9 л/га — перерослі бур'яни, більше ніж 4 листки

Метлюг, вівсюг, інші перерослі однорічні злакові та дводольні бур'яни

Ярі культури:

0,7 л/га — 2–4 листки у бур'янів;

0,9 л/га — перерослі бур'яни та культура.



Ефективність

ЕФЕКТИВНИЙ ПРОТИ
ГОЛОВНИХ ОДНОРІЧНИХ
ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ
ЯК НАВЕСНІ, ТАК І ВОСЕНИ

- Метлюг звичайний
- Вівсюг звичайний
- Китник мишачохвостий
- Мишій зелений
- Мишій сизий
- Очеретянка канарська
- Пажитниця багатоквіткова

СПЕКТР ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИ
ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ ВОСЕНИ

Вид бур'яну	Аксіал® Крос 0,7 л/га	Аксіал® Крос 0,9 л/га
Роман польовий	99,6	99,2
Грицики звичайні	100,0	100,0
Волошка синя	89,2	100,0
Кучерявець Софії	93,4	92,4
Підмаренник чіпкий	86,7	94,4
Герань розсічена	85,0	85,0
Ромашка лікарська	99,8	99,8
Ромашка непахуча	100,0	100,0
Незабудка польова	84,9	97,5
Мак-самосійка	99,4	100,0
Гірчиця польова	99,0	99,0
Зірочник середній	98,9	99,6
Талабан польовий	97,5	100,0
Падалиця ріпаку	99,8	99,8
Глуха кропива пурпурова	60,6	72,3

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИ ШИРОКОГО СПЕКТРА
ОДНОРІЧНИХ ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ НАВЕСНІ

Вид бур'яну	Аксіал® Крос
Роман польовий	100
Курячі очка польові	100
Приворотень польовий	99,3
Грицики звичайні	98,9
Волошка синя	97,8
Кучерявець Софії	100
Витка гречка березкоподібна	99,1
Підмаренник чіпкий	98,3
Латук дикий	95
Ромашка (види)	99,3
Незабудка польова	98,3
Мак-самосійка	96,8
Спориш звичайний	97
Редька дика	98,3
Гірчиця польова	98
Сухоребрик лікарський	100
Зірочник середній	99,3
Талабан польовий	98,9
Триреберник непахучий	95,8
Падалиця ріпаку	99,7

Слабкочутливі до Аксіал® Крос бур'яни

- Вероніка (види)
- Фіалка (види)
- Гірчак шорсткий
- Лобода біла
- Рутка лікарська
- Переліска однорічна
- Петрушка собача

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЮ ОДНОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТА СЛАБКОЧУТЛИВИХ ДО АКсіАЛ® КРОС ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ БАКОВУ СУМІШ:

 **Аксіал®** + **Дербі™ 175 SC**
ГЕРБІЦИД



Розкриймо потенціал рослини разом

syngenta

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70


Консультаційний центр

0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних
телефонів в Україні

www.syngenta.ua

ОФІЦІЙНИЙ ДОДАТОК
«СИНГЕНТА»



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play