

Культура	Норма витрати препарату	Норма витрати робочої рідини	Шкідливі об'єкти	Кратність обробок / Термін очікування, дні
<i>Дозволено для роздрібного продажу</i>				
СУНИЦЯ	10–12 мл на 5 л води	5 л на сотку	Плямистості листя (бура, біла), борошниста роса	2/30
ВИНОГРАД	10–12 мл на 8–10 л води	1,5–2 л розчину на кущ	Оїдіум, мілдью, антракноз	2/30
ГАЗОН	10–12 мл на 5 л води	5 л на сотку	Плямистості листя	2/–
<i>Дозволено для застосування в промисловому секторі</i>				
СОНЯШНИК	5–10 мл на 3–5 л води	3–5 л розчину на сотку	Альтернاریоз, фомоз, іржа, септоріоз, фомопсис, біла гниль	2/30
ЦУКРОВИЙ БУРЯК	5–10 мл на 3–5 л води	3–5 л розчину на сотку	Борошниста роса, церкоспороз, рамуляріоз, фомоз	2/30
СОЯ	5–10 мл на 3–5 л води	3–5 л розчину на сотку	Борошниста роса, септоріоз, пероноспороз, антракноз, аскохітоз, альтернاریоз, церкоспороз	2/30
<i>Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень</i>				
ХВОЙНИ	10 мл на 8–10 л води	2–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони	Шуте, побуріння глиці, іржа	2/–

СУМІСНІСТЬ. Амістар® Голд можна змішувати з іншими загальнозживаними пестицидами на відповідній культурі. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

ЗАСТОСУВАННЯ. 10–12 мл препарату розраховано для приготування 8–10 л робочого розчину. Перед застосуванням збовтати флакон. Розчин готувати безпосередньо перед початком обприскування.