ЗАХИСТ СУНИЦІ



ЗАХИСТ ГРУШІ ВІД МЕДЯНИЦІ



ЗАХИСТ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ



Вертимек®

syngenta

Розкриймо потенціал рослини разом®

syngenta

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр
0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ

НЕ ЗАЛИШАЄ ШАНСІВ КЛІЩАМ

Вертимек®

syngenta

Інсектоакарицид природного походження для захисту від комплексу сисних шкідників, рослиноїдних кліщів, трипсів.

Від інших інсектоакарицидів Вертимек® відрізняється тим, що діюча речовина абамектин — аналог природних абамектинів, які продукують ґрунтові гриби.

Завдяки цьому препарат має короткий термін очікування — до 14 днів. Ще одна відмінність препарату — після проникнення (протягом двох годин) в рослину Вертимек® залишається в паренхімі листка й утворює там своєрідні резервуари.

Ця властивість дозволяє контролювати кліщів навіть тоді, коли вони живляться на протилежному від обробленого боці листка.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА	Абамектин, 18 г/л
ХІМІЧНА ГРУПА	Авермектини
ХАРАКТЕР ДІЇ	Трансламінарна
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II клас
УПАКОВКА	1 л

ПЕРЕВАГИ

- Трансламінарна дія: повністю проникає в рослинні тканини протягом двох годин; утворює резервуари. Завдяки цьому ефективність не залежить від високих температур і дощу та гарантує подовжений захист
- Ефективно контролює всі види кліщів, мінерів, трипсів і медяниць
- Високоефективний при будь-яких, зокрема високих (понад +35 °С), температурах
- Забезпечує подовжений захист рослини (ефективний проти личинок, які відродилися з оброблених яєць)
- Сумісний із біометодом (безпечний для хижих кліщів і ентомофагів через 2–24 години після застосування)
- Не має фітотоксичності на чутливих культурах і сортах, не утворює на плодах «сітку»
- Короткий термін очікування (7–14 днів)

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Вертимек® протягом двох годин після застосування повністю проникає всередину листка й утворює в рослинних тканинах резервуари з абамектином.

СУНИЦЯ

Оптимально застосовувати Вертимек® на суниці проти суничного кліща у фазі появи молодого листя, для контролю трипсів — на початку заселення шкідником культури (найчастіше фаза бутонізації). При цьому додатково знижується чисельність рослиноїдних кліщів.

Обов'язково треба додати до препарату Вертимек® фруктозу в концентрації 0,3 % і провести подвійну обробку цією сумішшю з інтервалом 7–10 днів.

Норма витрати робочої рідини — 600 л/га.

ЯБЛУНЯ

Застосовують Вертимек® на плодових культурах при виявленні кліщів від 0,3–0,5 особин на лист або бруньку в період від початку розпукування бруньок до цвітіння, найчастіше в період порожевіння бутонів у яблуні. Цей захід дозволяє знищити самок, які виходять із місць зимівлі. Інший оптимальний період застосування Вертимек® — після цвітіння, коли препарат одночасно знищує кліщів (павутинних і кліща Шлехтендаля), медяницю, нижньобічну мінуючу міль і ще побічно впливає на попелиць.

- У період після цвітіння і до початку дозрівання обробку доцільно провести за наявності 3–5 особин на листок.
- Найкращий результат досягається, якщо використовувати препарат при першій появі шкідника.
- Щоб подовжити захисну дію препарату, потрібно провести подвійну (спарену) обробку препаратом з інтервалом 7–10 днів.
- У разі істотного заселення шкідником (суттєве перевищення ЕПШ) подвійну обробку проводять з інтервалом 5–7 днів.
- Норма витрати робочої рідини — 800–1200 л/га.
- Європейський досвід боротьби з грушевою медяницею ґрунтується на системі захисту з використанням препарату Вертимек®, який застосовують на початку відродження личинок другого покоління (фаза після цвітіння).



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Шкідники	Норма витрати, л/га	Максимальна кількість обробок / Терміни очікування, дні
Яблуня	Кліщі, попелиці, медяниця	1,0–1,5	3/14
Полуниця		0,5–1,0	2/7
Груша		1,0	3/14
Соя	Павутинний кліщ	0,6–1,0	2/30
Перець солодкий, баклажан	Кліщі, трипси, попелиці, колорадський жук	0,7–1,0	2/7
Огірок	Кліщі, білокрилки, попелиці, трипси	0,7–1,0	2/7
Виноград	Кліщі, зудень, листкова філоксера	1,0–1,5	2/14
Волоський горіх	Кліщі	1,0–1,5	2/14
Хмільники	Павутинний кліщ, хмелева попелиця	0,75–3,0	3/20

СПЕКТР ДІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЗАСТОСУВАННЯ

- Не обробляти препаратом у сонячну погоду та в період цвітіння культури.
- Вертимек® якісно проникає всередину рослинних тканин, але не поширюється в боки, тому треба якісно покрити рослини робочим розчином.
- Корисних ентомофагів можна випускати на оброблені площі через 24 години після обприскування.
- Щоб запобігти виникненню резистентності, варто застосовувати Вертимек® почергово з препаратами інших хімічних груп.
- Перед приготуванням бакових сумішей слід перевіряти препарати на сумісність (вона може бути неоднаковою при різній якості води).

Вертимек®

syngenta