

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ:

Культура	Норма витрати препарату	Норма витрати робочої рідини	Шкідливі об'єкти	Кратність обробок / Термін очікування
ВИНОГРАДНИКИ	50 г на 8 л води	1,5–2 л розчину на кущ	Мільдю	2 / 30
ТОМАТ (ВІДКРИТИЙ ҐРУНТ)	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Фітофтороз, альтернаріоз, профілактика чорної бактеріальної плямистості	2 / 14
КАРТОПЛЯ	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Фітофтороз, альтернаріоз	2 / 20
<i>Дозволено для застосування в промисловому секторі</i>				
КАВУН	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Пероноспороз, профілактика бактеріозу	2 / 30
ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Пероноспороз, профілактика бактеріозу	2 / 14
ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Пероноспороз, профілактика бактеріозу	2 / 14
ТОМАТИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Фітофтороз, профілактика чорної бактеріальної плямистості	2 / 14
ЦИБУЛЯ	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Пероноспороз, профілактика мокрої бактеріальної гнилі	2 / 14

СУМІСНІСТЬ: Препарат можна змішувати з іншими загальнозживаними пестицидами на відповідній культурі, але в кожному окремому випадку змішувані препарати слід перевіряти на сумісність.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Оптимальна температура застосування +12...24 °C

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ:

1. Для досягнення кращого ефекту рекомендовано вносити профілактично або при перших ознаках розвитку хвороби.
2. Тривалість захисного періоду **Ридоміл® Голд R** залежить від норми витрати продукту, термінів його застосування, ступеня інфікованості рослин на момент обробки і може становити не менше ніж 10–14 днів.
3. Рекомендується використовувати **Ридоміл® Голд R** у комплексній системі захисту з фунгіцидами, наприклад із **Квадріс®**, **Ревус® Топ**.
4. Не рекомендоване застосовувати в період цвітіння.