

Сумісність

Препарат можна змішувати з іншими загальноживаними пестицидами на відповідній культурі, але в кожному окремому випадку змішувати препарати слід перевіряти на сумісність.

+12 °C

+24 °C

ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

Особливості застосування продукту

- Для досягнення кращого ефекту рекомендовано вносити профілактично або при перших ознаках розвитку хвороби.
- Тривалість захисного періоду Ридоміл® Голд R залежить від норми витрати продукту, термінів його застосування, ступеня інфікованості рослин на момент обробки і може становити не менше ніж 10–14 днів.
- Рекомендується використовувати Ридоміл® Голд R у комплексній системі захисту з фунгіцидами, наприклад із Квадріс®, Ревус® Топ.
- Не рекомендовано застосовувати в період цвітіння
- Не рекомендовано використовувати в баковій суміші з амінокислотами.



syngenta

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua



НОВИНКА

НОВА ФОРМУЛА УЛЮБЛЕНОГО ФУНГІЦИДУ



 Ридоміл® Голд R

syngenta

 Ридоміл® Голд R

syngenta


Розкриємо потенціал рослини разом

®

Ридоміл® Голд R

Це фунгіцид з новою комбінацією діючих речовин задля ефективної протидії фітофторозу та пероноспорозу, а також з потужною профілактичною дією проти бактеріозів та альтернаріозів на овочах і винограді.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

 ПОВНА НАЗВА	Ридоміл Голд R 162 WG, ВГ
 ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	Металаксил-М, 20г/кг, хлорокис міді, 142 г/кг
 ХІМІЧНА ГРУПА	Феніламіди, неорганічні сполуки
 ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Вододисперсні гранули
 КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	II
 ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	3 роки



Головні переваги препарату

- Унікальна формула міді забезпечує ідеальне покриття
- Поєднання в одному препараті двох різних діючих речовин — системної та контактної дії
- Лікувальна і тривала профілактична дії
- Широкий спектр контрольованих хвороб та профілактика поширення бактеріозів і альтернаріозів
- Основа антирезистентної стратегії
- Нефітотоксичний для рослин

Діючі речовини препарату Ридоміл® Голд R впливають на збудника, не лише запобігаючи проростанню спор та проникненню в рослину, а й викорінюючи інфекцію із заражених тканин.



Унікальна формуляція фунгіциду Ридоміл® Голд R була розроблена з урахуванням основних проблем більшості вже існуючих фунгіцидів на основі міді.

Формуляція міді має високий ступінь розчинності, що покращує розподіл на рослині, запобігає змиванню й фітотоксичності та не потребує прилипача.

Ридоміл® Голд R — системно-контактний мідьвмісний фунгіцид з профілактичним впливом на бактеріози, які можуть виникнути внаслідок пошкоджень і за екстремальних погодних умов, з лікувальним ефектом проти ооміцетів на овочах, картоплі та винограді, з коротким періодом очікування.

Застосування препарату

Культура	Норма витрати препарату	Норма витрати робочої рідини	Шкідливі об'єкти	Кратність обробок / Термін очікування
ВИНОГРАДНИКИ	50 г на 8 л води	1,5–2 л розчину на кущ	Мільдю	2/30
ТОМАТ (ВІДКРИТИЙ ҐРУНТ)	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Фітофтороз, альтернаріоз, профілактика чорної бактеріальної плямистості	2/14
КАРТОПЛЯ	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Фітофтороз, альтернаріоз	2/20
<i>Дозволено для застосування в промисловому секторі</i>				
КАВУН	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Пероноспороз, профілактика бактеріозу	2/30
ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Пероноспороз, профілактика бактеріозу	2/14
ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Пероноспороз, профілактика бактеріозу	2/14
ТОМАТИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Фітофтороз, профілактика чорної бактеріальної плямистості	2/14
ЦИБУЛЯ	50 г на 5 л води	5 л розчину на сотку	Пероноспороз, профілактика мокрої бактеріальної гнилі	2/14